

## اطلاعیه شماره 17

### باغداران محترم استان:

احتراماً به منظور کنترل بیماری لکه آجری بادام ، استفاده از توصیه های فنی و سموم معرفی شده ذیل پس از بارندگی های هفته جاری حضورتان پیشنهاد می گردد :

الف : بطور کلی زمان انجام سم پاشی در کنترل این بیماری مهم تر از نوع سم می باشد.

ب : سم پاشی نوبت اول دو هفته پس از ریزش گلبرگ ها انجام شود.

ج : سم پاشی مرحله دوم 15 روز بعد از نوبت اول تکرار شود.

د : در صورت وقوع بارندگی در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد مرحله سوم سم پاشی ضروری خواهد بود.

سموم توصیه شده در این زمینه :

سم استروبی به نسبت 0/2 تا 0/3 در هزار

سموم مسی مانند مخلوط بردو به نسبت 10 در هزار و نوردوکس به نسبت 1/5 در هزار

سم توپاسی به نسبت 0/2 در هزار

لازم به ذکر می باشد استفاده از ترکیب سولفات روی به نسبت 1/5 در هزار باعث تأثیر بهینه سموم توصیه شده می باشد.

کشاورزان عزیز جهت کسب اطلاعات بیشتر به کلینیک های گیاهپزشکی و یا مراکز جهاد کشاورزی تابعه مراجعه نمایید .

کمیته پیش آگاهی و شبکه مراقبت

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری

فروردین ماه سال زراعی 96-97